a conserver

Observation sur une hidrocelle avec skirre

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE
C. 26 N 32/8

Vers la fin de May 1748 le nommé charles albert imbert dit Sans Souij agée de 48 ans d'un temperamment vif et sanguin, grand Mangeur, vivant d'aliments grossiers, porteur d'eau demeurant dans cette ville, et cy devant Soldat au regt. de sisson infanterie, m'envoia chercher pour me consulter sur une hidrocelle qu'il avoit depuis sa naissance; il me dit que de sa connoissance le testicule gauche avoit toujour eté plus gros que l'autre.

il se maria a l'age de dix neuf ans, il n'eut qu'un enfant il s'engagea ensuitte a l'age de vingt deux ans dans le susd. regt, quoique son testicule ne fut point d'une grosseur extraordinaire; il y avoit cependant des temps ou il souffroit assez pour l'empecher de pouvoir faire son service, et pour l'obliger d'entrer a plusieurs reprises aux hopitaux, ou on ne s'est attaché qu'a calmer ses douleurs. il me dit aussi n'avoir jamais eté attaqué d'aucune autre Maladie.

il sortit des troupes a l'age de trente six ans, et continua son metier jusqua quarante, alors la tumeur commença a augmenter, il y appliqua inutilement plusieurs topiques ordonnées par gens de l'art, elle continua d'augmenter jusqu'a l'age de quarante huit ans, et devint d'un volume si considerable, qu'il etoit obligé de se tenir au lit, elle avoit douze pouces de longueur, et dix huit de circonference, d'un rouge pourpre, et tous les vaisseaux de sa surface fort variqueux, la verge etoit confondue dans la tumeur depuis six ans, il rendoit les urines en nappe, il ressentoit des

tres grandes douleurs dans le bas ventre et dans les aines avec
vomissement, la tumeur même etoit fort sensible, le cordon
spermatique de ce coté la extremmement variqueux, et de la
grosseur de deux doits au moins jusque dans l'anneau.
je reconnus du fluide contenus dans cette tumeur, en consequence
je luy fis une ponction et j'en tiray plus de deux bouteilles
d'une eau rousse couleur de lessive sans mauvaise odeur, je luy
repetay cette ponction huit jours apres, et j'en tiray a peu prés
la même quantité d'eau et de la même qualité, apres ces deux
ponctions la tumeur n'a cependant rien perdu de son volume et
le malade n'en ayant pas eté soulagé, je luy propposay l'operation
comme le seul remede capable de le tirer d'affaire. je la fis le dix
de juin de la meme année en presence de Mrs. gertrude et
de masieres medecins de cette ville.

je commencay par une incision perpendiculaire a la partie
anterieure de la tumeur que j'allongay jusqu'a son extremité,
je reconnus qu'a l'extremité du cordon spermatique il y avoit un
kiste skirreux et fort epais qui se continuoit jusqu'à l'anneau
et que la membrane vaginale etoit confondue dans la tumeur,
ce qui me determina a faire une incision au dessus de la premiere
depuis l'anneau jusqu'à l'extremité du cordon spermatique
ou j'avois commencé ma premiere, que je mis a decouvert dans
sa face anterieure, ~~et~~ je dissequay les parties skirreuses qui
y etoient adherantes, et j'emportay ensuitte de droite et de

gauche plus de six livres pesant du Kiste et des Membranes Skirreuses qui etoient a peu pres de l'epaisseur de trois travers de doits, je fus obligé d'Etendre Mon incision jusqu'a la base du testicule droit que je mis a decouvert, le scrotum de ce coté la Etant aussi Skirreux. je laissay a l'extremité du cordon une portion du Kiste, pour Me tenir lieu de ligature qui N'étoit point praticable a cause de la grosseur et de la sensibilité; ce qui M'a tres bien réussi, N'ayant eu aucune Emoragie.

je le pansay au premier appareil avec la charpie brute, les compresses, et le suspensoir, je luy fis une Embrocation avec l'huille rosat sur le bas Ventre et les parties Voisines de la playe, ce qui fut continué pendant dix jours a chaque pansement, il fut saigné quatre heures apres l'operation, je luy prescrivis une Diette Exacte, luy permettant cependant trois verres de Vin par jour. je levay l'appareil vingt quatre heures apres, je detachay tout ce qui Voulut se detacher, et je le pansay avec le digestif ordinaire et l'Emplastre d'onguent de la mere, je continuay de le panser une fois par jour, le troisieme de l'operation, la fievre survint, elle dura douze heures, le quatrieme il y eut beaucoup de suppuration, et il se fit une tres grande fonte jusqu'au vingt; la playe commencoit alors Visiblement a se cicatriser, Mais la portion du Kiste que j'avois laissé a l'extremité du cordon N'ayant presque point suppuré, je fis fondre de la pierre a cautere dans l'eau dans laquelle je trempay un plumaceau que j'appliquay dessus, au bout de quelques jours il tomba des escarres, et elle suppura.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

quoique lecordon fut Extremmement Diminué, je fis des legeres frictions d'onguent De Mercure Dans L'aine Et tout le long du cordon, En trente Deux jours laplaÿe fut Enterement cicatrisé, Et il jouit Depuis cetemps d'une santé parfaitte;

il M'avoüa Depuis saguerison, que Malgré Mes deffenses il avoit Mangé Du pain Et Delaviande Dés le lendemain De l'operation, Et quil avoit continué D'en Manger pendant tout letraitement.

je laisse a l'academie a tirer les consequences Et preceptes qui peuvent résulter De cette observation.

a arras ce 12^me^ avril 1786. Durand chirurgien
major